

Tableau 2 Répartition des cas selon les symptômes cliniques et les résultats d'examens paracliniques et comparaison de la positivité au VRS selon ces caractéristiques

Symptômes cliniques et signes paracliniques	Ensemble des sujets ($n = 120^a$)	VRS positif ($n = 32^a$)	VRS négatif ($n = 88^a$)	p
Fièvre	95 (79 %)	27 (84 %)	68 (77 %)	0,397
Rhinorrhée	63 (53 %)	23 (72 %)	40 (45 %)	0,010*
Laryngite	7 (6 %)	2 (6 %)	5 (6 %)	1,000
Toux	100 (83 %)	26 (81 %)	74 (84 %)	0,712
Sibilants	34 (28 %)	11 (34 %)	23 (26 %)	0,376
Dyspnée	48 (40 %)	18 (56 %)	30 (34 %)	0,028*
Vomissements	46 (38 %)	15 (47 %)	31 (35 %)	0,246
Diarrhée	33 (28 %)	6 (19 %)	27 (31 %)	0,195
Conjonctivite	14 (12 %)	2 (6 %)	12 (14 %)	0,265
Compte de lymphocytes élevé ($\geq 8000/\text{mm}^3$)	31 (26 %)	6 (19 %)	25 (28 %)	0,285
Radio thorax anormale	61 (59 %)	10 (40 %)	51 (65 %)	0,025*

**Notez qu'il y a des valeurs manquantes pour certaines variables, ce qui explique que la somme de catégories de ces variables peut être inférieure au nombre total. Notez aussi que les pourcentages des cas VRS positifs et VRS négatifs sont des pourcentages en colonne.*

**Significatif: $p \leq 0,05$*