

Tableau 4 Prévalence des différents sites d'infections nosocomiales

Pays	IU	IR	ISO ^a	Peau/tissus mous	Bactériémie	Autres ^b
Algérie						
Nbre d'infections	29	17	18	33	2	20
Fréquence relative (%)	24,4	14,3	15,1	27,7	1,7	16,8
Prévalence (%)	1,8	1,0	1,1	2,0	0,0	1,2
Égypte						
Nbre d'infections	34	13	46	10	14	8
Fréquence relative (%)	27,2	10,4	36,8	8,0	11,2	6,4
Prévalence (%)	3,0	1,1	4,0	0,9	1,2	0,7
Italie						
Nbre d'infections	24	12	3	1	8	3
Fréquence relative (%)	47,1	23,5	5,9	2,0	15,7	5,9
Prévalence (%)	6,5	3,2	0,8	0,3	2,2	0,8
Maroc						
Nbre d'infections	1	12	5	-	-	-
Fréquence relative (%)	5,6	66,7	27,8			
Prévalence (%)	0,4	4,5	1,9			
Tunisie						
Nbre d'infections	34	32	9	34	27	22
Fréquence relative (%)	21,5	20,3	5,7	21,5	17,1	13,9
Prévalence (%)	2,8	2,6	0,7	2,8	2,2	1,8
Total						
Nbre d'infections	122	86	81	78	51	53
Fréquence relative (%)	25,9	18,3	17,2	16,6	10,8	11,3
Prévalence (%)	2,6	1,9	1,7 ^a	1,7	1,1	1,1

^a La prévalence des ISO chez les patients opérés était de 6,6 %. Elle était de 6,2 % en Algérie, de 11,5 % en Égypte, de 1,7 % en Italie, de 5,3 % au Maroc et de 3,4 % en Tunisie.

^b « Autres » comprend les infections gastro-intestinales, les infections des os et articulations, les infections de l'œil, de l'oreille, du nez, de la gorge et de la bouche, les infections cardio-vasculaires et les infections du système nerveux central.

IU : infections urinaires ; IR : infections respiratoires ; ISO : infections du site opératoire.