

Tableau 2 Critères de qualité de l'acte vaccinal

Critères	Effectif (n = 55)	%
Réception des vaccins dans une glacière	54	98,2
Vérification que la date de décongélation des flacons de VPO < 6 mois	3	5,5
Vérification que si un flacon est entamé, sa date d'ouverture < 15 jours pour le VPO et dT	35	63,6
Vérification que si un flacon est entamé, sa date d'ouverture < 6 heures pour le RR	32	58,2
Disponibilité d'un plateau contenant des accumulateurs spéciaux de froid sur la table	47	85,5
Disponibilité d'un collecteur pour les seringues et aiguilles à usage unique utilisées	42	76,4
Disponibilité des tampons de coton et de l'alcool sur la table	54	98,2
Disponibilité d'une boîte d'urgence	23	41,8
Port d'un tablier	44	80
Bien se laver les mains avant la séance vaccinale	16	29,1
Bien se laver les mains après l'acte vaccinal	3	5,5
Assurer une bonne désinfection de la peau au point d'injection	52	94,5
Siège de vaccination respecté	51	92,7
Éviter de recapuchonner les aiguilles	46	83,6
Placer les seringues et les aiguilles utilisées dans un collecteur	40	72,7
Ramener ces déchets au CSB pour s'en débarrasser	41	74,5
Passer quelques messages éducatifs sur l'intérêt de la vaccination	37	67,3
Expliquer l'importance de bien conserver la carte de vaccination	23	41,8
Prévenir et dépister les MAPI	44	80

CSB = Centre de Santé de Base ; MAPI = manifestations postvaccinales indésirables.