

Tableau 2 Répartition des travailleurs en fonction des paramètres clinico-biologiques

Variables	Travailleurs postés		Travailleurs non postés		P
	Nombre	%	Nombre	%	
Antécédents familiaux					
Absents	30	23,6	33	24,3	0,7
Diabète	74	58,3	80	58,8	
HTA	23	18,1	22	16,2	
Autres	10	7,9	8	5,9	
Antécédents personnels					
Absents	92	72,4	107	78,7	0,37
Diabète	10	7,9	7	5,1	
HTA	8	6,3	11	8,1	
Autres	17	13,4	11	8,1	
	Moyenne(ET)		Moyenne (ET)		
IMC	29,3 (3,9) kg/m ²		29,1(3) kg/m ²		0,6
Tour de taille	98,4 (9) cm		94,8 (8,2) cm		0,01
PAS	120 (89) mmHg		122 (96) mmHg		0,67
PAD	79 (37) mmHg		79 (47) mmHg		0,82
Glycémie à jeun	5,6 (1,4) mmol/L		5,4 (1,2) mmol/L		0,22
Profil lipidique					
Triglycérides	1,4 (0,5) mmol/L		1,2 (0,5) mmol/L		0,011
Cholestérol total	4,9 (1,7) mmol/L		4,4 (1) mmol/L		0,04
Cholestérol HDL	0,41 (0,15)		0,43 (0,09)		0,15

HTA : hypertension artérielle ; ET : écart type ; IMC : indice de masse corporelle ; PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diastolique.