

الأرقام الرئيسية عن كوفيد-19 اعتباراً من 28 مارس/آذار 2021



المجمعة منذ 24 فبراير/شباط 2020	الأسبوعية (الأسبوع 13)	المسجلة في آخر 24 ساعة	عدد الفحوص	عدد الحالات المؤكدة	عدد الحالات النشطة	عدد حالات الشفاء	عدد الوفيات
8,197,431	289,053	30,036					
873,568	41,140	6,423					
80,570	47,970	16,129					
778,535	32,600	5,664					
14,463	251	39					



النقاط الرئيسية

- لا يزال وضع جائحة كوفيد-19 في العراق مثيراً للقلق الشديد مع الزيادة المستمرة في أعداد الحالات التي يتم الإبلاغ عنها منذ الأسابيع الأولى من العام 2021.
- خلال الأسبوع 13 أبلغت وزارة الصحة العراقية عن 41,140 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6,76% مقارنة مع الأسبوع 12، و251 وفاة جديدة بمعدل زيادة 22.44% مقارنة مع الأسبوع الذي سبق.
- بلغ معدل الحالات الإيجابية خلال هذا الأسبوع 15%، مما يشير إلى استمرار انتشار عدوى¹ جائحة كوفيد-19 في المجتمع.
- تلقى أكثر من 61,000 شخص اللقاح المضاد للمرض باستخدام لقاحات AZD1222 (استرازينيكا) في إطار عملية التطعيم المستمرة في جميع أرجاء العراق خلال فترة هذا التقرير. تستهدف حملة التطعيم العاملين في القطاع الصحي، والمسنين (الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً)، والأشخاص الذين يعانون من اعتلالات مصاحبة، واللاجئين، وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين لا يستطيعون تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي بسبب طبيعة عملهم أو غير ذلك من الظروف المحيطة.

الرسم البياني 1: المئتي البوابي للحالات المؤكدة بحسب الوضع الوبائي الأسبوعي 2020 إلى 2021



مصدر البيانات: وزارة الصحة، العراق

لمزيد من المعلومات حول الأرقام الخاصة بكوفيد-19، يرجى زيارة لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق على:

<https://covid19.who.int/regional/emro/country/iq>

1- تُعرف العدوى المجتمعية (عندما يتجاوز معدل الإيجابية لفحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR» للكشف عن مرض كوفيد-19 نسبة 5%)

الأرقام الرئيسية	2020	2021	الأُسبوع 13	
إجمالي الحالات المؤكدة	597,774	275,794	41,140	
معدل الحدوث ² /100,000/أسبوعياً	37	53	102	
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل الحدوث	دهوك	62	النجف	122
	واسط	55	كربلاء	99
	بغداد	53	البصرة	94
	كركوك	47	بغداد	84
	إربيل	46	واسط	80
معدل إماتة الحالات ³	2,1	0,6	0,6	
دوائر الصحة الخمس الأعلى في معدل إماتة الحالات	السليمانية	5.4	السليمانية	1.6
	ذي قار	3.4	دهوك	1.6
	بابل	2.9	إربيل	1.3
	إربيل	2.5	كركوك	1.1
	ميسان	2.4	المثنى	0.9
نسبة الوفيات بعد 48 ساعة من دخول المستشفى	%53	%21	13	
نسبة الحالات النشطة	%7	%9.2	لا يوجد	
نسبة حالات الشفاء	%90	%89	لا يوجد	
عدد فحوصات PCR	4,547,545	3,642,932	289,053	
معدل الإيجابية العام لفحص PCR ⁴	%13	%8	%14	
نسبة المرضى الداخليين	%78	%59	%57	
نسبة الحالات المعالجة في وحدة العناية المركزة	%10	%10	%8	
عدد الإصابات بين مقدمي الرعاية الصحية	24,283	4,546	251	
عدد الوفيات بين مقدمي الرعاية الصحية	256	10	0	
عدد الإبلاغات عن كوفيد-19 بين اللاجئيين والنازحين داخلياً	النازحون داخلياً = 285	النازحون داخلياً = 40	0	
	اللاجئون = 278	اللاجئون = 23		



- تستمر حالات كوفيد-19 المبلغ عنها في العراق في الازدياد خلال الموجة الثانية من انتشار المرض في المجتمع والتي بدأت في العام 2021. ارتفع معدل حدوث الإصابات لكل 100,000 شخص أسبوعياً من 38 في العام 2020 إلى 53 في الأسابيع الـ13 الأولى من 2021 و إلى 102 حالة خلال الأسبوع 13.
- أكثر المحافظات تضرراً خلال الأسبوع 13 هي واسط (100,000/192)، البصرة (191)، بغداد (167)، النجف (125) وكربلاء (98) والفتة العمرية الأكثر تضرراً داخل العراق هي 30-39 سنة، وتبلغ النسبة الإجمالية للذكور إلى الإناث 43%:57%.
- يمثل مقدمو الرعاية الصحية نسبة 3,3% من إجمالي الحالات المسجلة، وسجلت النسبة الأعلى بين الممرضين والفرق الطبية المساعدة (53%)، يليهم موظفو الإدارة والدعم (30%) والطواقم الطبي (17%).
- بلغ المعدل الإجمالي للوفيات 0,6%، وكانت معظم الوفيات المبلغ عنها لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 60-69 سنة، حوالي 60% منهم مصابون باعتلالات مصاحبة.
- المعدل الإجمالي للحالات النشطة للعام 2021 هو 9,2%، ومعدل الشفاء 89,2%.
- مع معدل انتشار كوفيد-19 بنسبة 1,14 على المستوى الوطني، فإن التوقعات بشأن هذا المرض تشير إلى زيادة أعداد الإصابات، والمرض، والإبلاغ، والإدخال إلى المستشفيات وإلى وحدات العناية المركزة والوفيات في الأسابيع المقبلة.
- المزيد من التفاصيل في لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية <https://bit.ly/3uu5w0w>

(2) تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية

أ- الاستجابة إلى كوفيد-19

- أعدت مجموعة الصحة تنسيق فريق العمل الوطني الخاص بكوفيد-19 تحت قيادة وإشراف منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان استجابة منسقة ومتزامنة بشكل جيد لجميع تدخلات كوفيد-19. يتألف فريق العمل الوطني من أعضاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة.

ب- التطعيم


- تم تطعيم أكثر من 61,000 من العاملين في قطاع الصحة، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والمصابين باعتلالات مصاحبة، واللاجئين، والعاملين الأساسيين بلقاح AZD1222 (استرازينيكا) الذين تسلمته البلاد في 25 مارس/آذار عبر مبادرة كوفاكس.

2- يشير معدل الحدوث إلى تكرار وقوع بعض الأحداث، مثل مرض أو حادث ما، خلال فترة زمنية محددة.

3- معدل إماتة الحالات هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معين بين جميع الأفراد الذين تم تشخيصهم خلال فترة زمنية معينة.

4- معدل الإيجابية لفحص PCR هو النسبة المئوية لجميع فحوصات PCR التي تؤكد إيجابية الإصابة بمرض كوفيد-19 من بين جميع فحوصات PCR التي تم إجراؤها على مدار فترة زمنية معينة.

الرسم البياني 2: عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بحسب المحافظة ونوع اللقاح



تم إطلاق عملية التطعيم الواسعة، التي بدأت خلال فترة الإبلاغ، في جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان العراق.

لضمان البدء المبكر للتطعيم في البلاد، حدد العراق نسبة 20% من السكان ذوي الأولوية، أو المجموعات المستهدفة باتباع إرشادات كوفاكس. تم كذلك تطعيم أكثر من 29,000 شخص في البلاد باستخدام لقاح سينوفارم الصيني ابتداء من 2 آذار/مارس 2021. وبهذا وصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ 2 آذار/مارس 2021 إلى أكثر من 90,000 شخص.

قامت فرق منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بزيارة ميدانية إلى سامراء في إطار عملية إشراف داعم ومراقبة لعملية التطعيم ضد كوفيد-19. ولتعزيز عملية التطعيم، قامت الفرق بإطلاع وإرشاد العاملين الصحيين بشأن مراقبة سلسلة التبريد لتخزين اللقاحات، والتأكيد الإلكتروني للمواطنين.

ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

تواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع وزارة الصحة واليونيسف وغيرها من الشركاء لتعزيز التوعية بشأن لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية، والمشاركة المجتمعية، وفي الوقت ذاته تعزيز جميع إجراءات الوقاية الأخرى من كوفيد-19 مثل ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

إلا أن هناك حاجة إلى تكثيف المشاركة المجتمعية والحوار خاصة مع النساء لزيادة الاهتمام بأخذ لقاح كوفيد-19. تظهر البيانات حالياً أن عدد الذكور الذين تلقوا اللقاح يفوق عدد الإناث.

ث- الخدمات اللوجستية وإدارة الإمدادات

تواصل منظمة الصحة العالمية تعزيز استجابتها لكوفيد-19 ودعم برنامج الطوارئ الحالي. خلال فترة التقرير، دعمت منظمة الصحة العالمية مركز الأنبار للتأهيل، ومستشفى الرمادي العام في محافظة الأنبار.

- جهاز تصوير شعاعي محوسب واحد، ودرع الحماية من الأشعة السينية
- ثلاث وحدات تعقيم البخار
- 75 كرسيًا متحركًا للبالغين والأطفال.

3 المتطلبات والاحتياجات الطارئة

ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والموارد الأخرى لضمان توفير ما يكفي من اللقاح لنسبة كبيرة من السكان المؤهلين في أقرب وقت ممكن.

مواصلة حملة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح بين السكان.

البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

- مع استمرار تزايد انتشار عدوى كوفيد-19 في المجتمع، سجلت بعض المحافظات ومن بينها المثنى، النجف، وبغداد سعة أسرة غير كافية في المستشفيات وارتفاع الإشغال في وحدات العناية المركزة. وهذا يجعل من الصعب استيعاب العديد من حالات الادخال إلى المستشفيات بمن فيهم العديد من المرضى الذين يعانون من حالات حرجة، وليس فقط المرضى بكوفيد-19 ولكن غيرها من الحالات الصحية. في محافظة صلاح الدين، يتدهور وضع القدرة الاستيعابية لأسرة وحدات العناية المركزة بشكل سريع.
- زاد التردد في أخذ اللقاح بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، بسبب التغطية الاعلامية السلبية للقاح استرازينكا.
- يمثل ضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية والإغلاقات الجزئية الموصى بها خطراً كبيراً على المجتمعات.
- يجب الحصول على تمويل لمواصلة ودعم التدخلات الخاصة بكوفيد-19 مثل حملة الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لتشجيع على الممارسات المجتمعية الجيدة لمنع انتشار كوفيد-19 وضمان أخذ اللقاحات وتعزيز الاستعداد لحالات الإصابة بكوفيد-19 ورصدها والاستجابة لها.

(5) التوصيات

- يجب تعزيز مراقبة العدوى والوقاية منها ومكافحتها لتقليل أعداد الإصابات والوفيات بين مقدمي الرعاية الصحية. تشير البيانات الواردة من وزارة الصحة إلى زيادة معدلات الوفيات بين العاملين في القطاع الصحي خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020. العاملون في مجال الصحة في خطر شديد من التعرض لفيروس كوفيد-19 بسبب طبيعة عملهم وتفاعلهم مع المرضى من مختلف قطاعات المجتمع. إن دعم العاملين في القطاع الصحي لتعزيز مراقبة العدوى والوقاية منها ومكافحتها من خلال توفير الإمدادات الطبية الإضافية والتدريب سيساعد في الحفاظ على صحتهم. <https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---31-march-2021>
- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على أخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- تسريع وتيرة التعبئة الاجتماعية وحملات التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لوباء كوفيد-19 في العراق، وهم:



BILL & MELINDA GATES foundation



Department for International Development



Canada
Department of Foreign Affairs,
Trade and Development

لمزيد من المعلومات حول تقرير الحالة هذا، يرجى الاتصال بـ:

1. بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: ajellopa@who.int
2. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: sabaratnamv@who.int
3. الدكتورة جيهان البدري، مسؤولة فنية، الأمراض المعدية، هاتف: +9647901673299، بريد إلكتروني: albadri@who.int
4. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int