



عدد الوفيات



17,83051

عدد حالات الشفاء



1,356,267

عدد الحالات المؤكدة



1,491,712

عدد الحالات النشطة



117,615

عدد الفحوص



12,506,968

النقاط الرئيسية:

1. في الأسبوع 28، استمر المنحنى الوبائي لكوفيد-19 بالارتفاع في عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات ذا الصلة. وقد أبلغت وزارة الصحة عن إجمالي 62,350 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، ما يمثل 151 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 282 حالة، مع معدل إماتة حالات 0.45%.
2. سجلت المحافظات الثلاث المثني وذي قار والديوانية معدل الإصابة الأعلى بكوفيد-19 في الأسبوع 28، والذي بلغ ما يزيد عن 150 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان.
3. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العراق، مع دخول محافظتي النجف وذي قار ضمن الفئة عالية المخاطر، وبقاء محافظة الأنبار وحدها ضمن فئة العدوى المتوسطة.
4. حتى تاريخ 18 يوليو/تموز، تم إعطاء إجمالي 1,437,612* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، ما يعني أن 6.2% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
5. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء 529,176 جرعة من لقاح استرازينيكا، و485,719 جرعة من لقاح فايزر، و 399,129 جرعة من لقاح سينوفرم الصيني.




ملاحظات للقراء:

- 1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هنا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- 2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwIk>

1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 28، (12-18 يوليو/تموز 2021)


- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 62,350، ما يمثل زيادة قدرها 4,463 حالة في الأسبوع 28. بلغت النسبة المئوية للتغيير في الفترة المشمولة في التقرير 7.7 مقارنةً بالأسبوع 27. بلغ معدل حالات الإصابة الإيجابية بكوفيد-19 هذا الأسبوع 151 حالة لكل 100 ألف من السكان.

COVID-19 Epi-Curve in Iraq 2020-2021




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 28، 2021

COVID-19 Epi-Curve 2020-2021




الشكل 2: المنحنى الوبائي للمرض في العراق 2020-2021 (الأسبوع 28)

بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (28) 295,915 فحصاً، أي أقل بمقدار 25,033 فحصاً مقارنة بالأسبوع 27، وبمعدل 7,184 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 3: فحوص RT-PCR في العراق في الأسبوع 28، 2021

- يشير معدل الإيجابية في الأسبوع 28 إلى أعلى ارتفاع في عدد الحالات المبلغ عنها خلال 2021. إذ ارتفع المعدل هذا الأسبوع ليصل إلى 21%. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي كربلاء 41.9% وذي قار 36.9% وميسان 33.8%. بالمقابل، وتم تسجيل أدنى معدل في الأنبار ونيوى عند 5.6% و12.7% على التوالي.




الشكل 4: معدل الإيجابية لكوفيد-19 في العراق - الأسبوع 28، 2021

- بلغ عدد حالات الوفاة المتصلة بالمرض المبلغ عنها هذا الأسبوع 282 حالة، ما يمثل زيادة قدرها 50 حالة وفاة مقارنة بالأسبوع 27. أما معدل إماتة الحالات فقد بلغ 0.45%، وهو لا يمثل فرقاً كبيراً عن معدل إماتة الحالات المُبلغ عنها في الأسابيع السابقة.




الشكل 5: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في العراق 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (28) 2,660 مريضاً يومياً مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 1.5%. كما بلغ معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة هذا الأسبوع 22% مقارنة بـ 19% في الأسبوع 27.



الشكل 6: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات ووحدة العناية المركزة حسب الأسابيع - الأسبوع 28، 2021

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و26% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و52% على التوالي.
- يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث في الأسبوع 28 إلى 1.5 و1.6 على التوالي.



الشكل 7: التوزيع الجنساني لحالات الإصابة/الوفيات المؤكدة بكوفيد-19 حسب الفئة العمرية في الأسبوع 28، 2021

ملاحظة: (تشير القيمة *0 في الشكل 7، المخطط الدائري الأيمن، إلى عدد الوفيات الفعلي البالغ 11 وفاة)

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 28:

خلال الأسبوع 28، استمرت العدوى المجتمعية بالانتشار بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في ذي قار والنجف، في الوقت الذي كانت فيه العدوى المجتمعية متوسطة في الأنبار.

المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأناج	متوسطة	متوسطة	منخفضة	22	1	6	2	1	2	5	متوسطة
بابل	هائلة	هائلة	متوسطة	93	9	21	3	2	3	9	هائلة
بغداد	هائلة	هائلة	متوسطة	165	9	21	4	2	4	10	هائلة
البيصرة	هائلة	هائلة	متوسطة	226	7	31	4	2	4	10	هائلة
الديوانية	هائلة	هائلة	متوسطة	205	9	26	4	2	4	10	هائلة
ديالى	هائلة	هائلة	متوسطة	121	1	25	4	1	4	9	هائلة
كربلاء	هائلة	هائلة	منخفضة	252	2	42	4	1	4	9	هائلة
كركوك	هائلة	هائلة	متوسطة	98	7	20	3	2	3	9	هائلة
كربلاء	هائلة	هائلة	متوسطة	155	7	12	4	2	4	9	هائلة
ميسان	هائلة	هائلة	متوسطة	230	7	34	4	2	4	10	هائلة
المتن	هائلة	هائلة	متوسطة	158	6	29	4	2	4	10	هائلة
النجف	هائلة	هائلة	هائلة	159	11	26	4	3	4	11	عالية
نينوى	هائلة	هائلة	منخفضة	52	2	13	3	1	3	7	هائلة
صلاح الدين	هائلة	هائلة	منخفضة	57	1	12	3	1	3	7	هائلة
ذي قار	هائلة	هائلة	هائلة	258	18	37	4	3	4	11	عالية
واسط	هائلة	هائلة	متوسطة	251	6	30	4	2	4	10	هائلة
العراق	هائلة	هائلة	متوسطة	151	7	21	4	2	4	10	هائلة

جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 28، 2021

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:


أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى الأسبوع 28، تم إعطاء إجمالي 1,437,612 * جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن 6.2% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. تشير البيانات المبلغ عنها أيضاً أن 892,778 من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 544,834 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.

- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 28 أن 587,253 (66%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 298,435 (34%) من الإناث. فيما حصل 352,582 (65%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 189,856 (35%) من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.


- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 407,411 (28%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 1,030,201 (72%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.

- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى بغداد - الكرخ بمعدل (7.6%)، تليها النجف (6.6%)، والبصرة (5.5%)، وكربلاء (4.9%)، وكركوك (4.1%)، وبابل (4.6%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 28 في السليمانية (1.4%)، وميسان ونيوى (2.3%)، لكل منهما، وصلاح الدين (2.5%) وواسط (2.7%)



الشكل 8: قيم التطعيم اليومية ضد كوفيد-19 في الأسبوع 28، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 1,330,393 * جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



الشكل 9: التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح/الشهر - الأسبوع 28، 2021

(ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية :



- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زارت منظمة الصحة العالمية مستشفى شار لدعم الإشراف على فحوصات RT-PCR. مستشفى شار هو مستشفى الإحالة التعليمي الرئيسي في السلبيانية ويقدم خدماته لما يقدر بنحو 2.4 مليون نسمة على مستوى المحافظة. ويوجد فريقان مؤهلان في المستشفى لإجراء مسحات الأنف لجميع الحالات المشتبه فيها والأشخاص الراغبين بإجراء الفحص بناءً على طلبهم. وقد وصل عدد مسحات الأنف اليومية التي جمعها الفريق في إحدى المرات إلى 450 مسحة. وتعد هذه طريقة مثالية لتتبع حالات كوفيد-19، إذ يتم فحص جميع المسحات المجمعة في مختبر الفيروسات وعلم الأمراض الجزيئية الرئيسي في مستشفى الشهيد طاهر. ومن الجدير بالذكر أنه في السلبيانية، تقدم بعض المرافق الصحية الحكومية فحوصات RT-PCR مجاناً، بينما يقدم البعض الآخر فحوصات تعد نسبياً أرخص من غيرها.

- سلمت منظمة الصحة العالمية ست منصات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستودع دائرة صحة دهوك ومنظمة هيبي غير الحكومية لسد الثغرات في مرافق الصحة العامة ومخيمات النازحين داخلياً في محافظة دهوك.


- لتعزيز حملة التطعيم في مخيمي دوميذ 1 و2 للاجئين في مركز قضاء سميل بمحافظة دهوك، شاركت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع دائرة صحة دهوك والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، في افتتاح وحدة التطعيم ضد كوفيد-19 في مركز الرعاية الصحية الأولية بمخيم دوميذ 1 للاجئين.
- أرسل فريق منظمة الصحة العالمية أيضاً بعثة تقييم إلى مستشفى الشخان العام في قضاء شيخان لتقييم احتياجات المستشفى والثغرات التي تعاني منها، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19، ومناقشة الدعم المحتمل لتعزيز الاستجابة للمرض.
- عقدت منظمة الصحة العالمية مناقشات مع دائرة صحة ذي قار بشأن الدعم الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية لتقديمه إلى وحدات عزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى الحسين التعليمي، بما في ذلك توفير المعدات والمستلزمات الحيوية. ويعد هذا الدعم ضرورياً لإعادة تأهيل فريق كوفيد-19 في أعقاب الحريق المؤسف الذي أدى إلى وفاة 62 مريضاً بكوفيد-19 وإصابة 50 آخرين.

ت) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:




بالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة صحة ميسان واليونيسف، أجرت منظمة الصحة العالمية أنشطة تتعلق بالتوعية والمشاركة المجتمعية في محافظة ميسان بهدف تعزيز الإقبال على اللقاح المضاد لكوفيد-19. ومن بين الأنشطة التي تم إجراؤها: اجتماعات تعريفية مع الصحفيين والإعلاميين والعاملين الصحيين في المحافظة، وحملات ترويجية في الشوارع، بما في ذلك التطعيم في الموقع. وخلال ورش العمل، تم تشجيع المشاركين على طرح الأسئلة حول التحصين واللقاحات، وتم الرد عليهم من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية ودائرة الصحة ووزارة الصحة. وخلال هذه الفعالية، تم تطعيم أكثر من

35 شخصاً من بينهم كبار في السن وعناصر من الشرطة ونساء وذلك في غضون ساعتين. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الفعالية قد بثت مباشرة عبر تطبيق فسيبوك وشاهدها 15,000 متابع في جميع أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة.



1. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (المزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر [هنا](#))



2. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى. ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.

4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالات جديدة من كوفيد-19 مثل سلالة (سلالات) دلتا مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ونقص إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- انخفاض مستويات التطعيم والإقبال عليه مع زيادة التردد في أخذ لقاح استرازينيكا.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:

- الالتزام الاجتماعي بإجراءات الوقاية والمكافحة للحد من انتقال الفيروس.
- يعتبر الإغلاق الجزئي أو الكامل ذا قيمة كبيرة لتقليل حجم التصاعد الحالي في عدد الإصابات إذا ما تم تنفيذه بطريقة صحيحة.
- التطعيم هو الحل الأمثل.
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.
 - ✓ استخدام موسم الحج لاستدعاء الفئات العمرية الكبيرة المؤهلة التي يخطط أصحابها للذهاب للحج و/أو العمرة، لتسريع عملية التسجيل وأخذ لقاحاتهم.
 - ✓ حث المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم، والاستفادة من بطاقات الأدوية السنوية التي يحملها هؤلاء الأشخاص وزيارتهم الشهرية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة لهم للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة. يمكن تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بكميات جزئية من اللقاحات لتنفيذ الإجراء المقترح.

- ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
- ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكّل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة (سلالات) دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- في اجتماعه الذي عقد في 15 يوليو/تموز، ركز فريق عمل مجموعة الصحة الخاص بكوفيد-19 على جلسة تبادل للمعلومات بشأن الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية. وتم تقديم موجز عن الاستطلاع الذي أجرته وزارة الصحة حول نية أخذ التطعيم ضد كوفيد-19، والذي يندرج في إطار سلسلة المنتجات المعرفية التي يقودها البنك الدولي لجمع المعلومات العالمية حول المواقف تجاه لقاح كوفيد-19 والتردد في أخذه. وأجري الاستطلاع المنفذ عبر إعلانات تم نشرها على الفيسبوك والمسنجر في الفترة ما بين 3 و20 فبراير/شباط 2021. وبلغ معدل استكمال الاستطلاع 89%، أي أنه تم استكمال 9431 استطلاعاً. وأظهرت النتائج أن 45% من المشاركين في الاستطلاع كانوا غير متأكدين مما إذا كانوا سيأخذون اللقاح أم لا. ولا يقتصر التردد بشأن أخذ اللقاح على السكان العاديين، حيث إن 41% من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين شملهم الاستطلاع يندرجون تحت فئة "غير متأكد". وكانت المخاوف الرئيسية بشأن أخذ لقاح كوفيد-19 تتعلق بالمخاطر الصحية، وانخفاض الثقة في المؤسسات، والخوف من الإصابة بالمرض.
- كما تم عرض الاستطلاع الذي أجرته منظمة انترسوس في بلدة تلعفر بمحافظة نينوى حول التردد في أخذ اللقاح. إذ وافقت 763 أسرة من أصل 785 أسرة تم الاتصال بها على المشاركة في الاستطلاع (354 أنثى و409 ذكر). وأظهرت النتائج أن 54% من النساء (190 امرأة) و48% من الرجال (197 رجلاً) ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنه من الممكن أو من المرجح جداً أن يأخذوا اللقاح. ومن بين الذين لم يكونوا مستعدين لأخذ اللقاح، قال 50% (99 شخصاً) إنهم لا يعتقدون أنه يمكن الحصول على اللقاحات، تلى ذلك انعدام الثقة بسبب الآثار الجانبية المحتملة للقاح (36%، 71 شخصاً)، وعدم توفر تجارب طويلة الأمد على اللقاح (16%، 32 شخصاً). بشكل عام، قال 51% من المشاركين إنهم من المرجح أو من المرجح جداً أن يحصلوا على التطعيم، وهو ما يختلف عن نتائج الاستطلاع الذي أجره غازي وآخرون (2021)، والذي يشير إلى أن 77.6% من السكان في العراق قالوا إنهم سيأخذون اللقاح إذا كان متاحاً، مع العلم أن الاستطلاعين اعتمدا على العينات العشوائية.

- وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت حالات كوفيد-19 بين الأشخاص المعنيين حتى تاريخ 14 يوليو/تموز 2021 كما يلي:
- أ) إجمالي عدد حالات الإصابة: 1.024 (488 لاجيء + 536 نازح داخلياً)
- ب) عدد الوفيات: 72
- ت) عدد حالات الشفاء: 823
- ث) عدد الحالات النشطة: 32
- ج) النتيجة غير معروفة: 97

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int

د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد الكتروني: hatahitw@who.int

السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال، هاتف: +96477729877288، بريد إلكتروني: ajellopa@who.int